

## Ficha Técnica

**Nombre comercial:** ACTIFUNG®

**Ingredientes activos:** Extracto de hoja de gobernadora + Extracto de cáscara de nuez + extracto de agave lechuguilla

**Tipo de producto:** Fungicida botánico

**Formulación:** Concentrado emulsionable



### Concentración:

INGREDIENTES ACTIVOS	%
Extracto de hoja de gobernadora.....	50.00
(Equivalente a 498.2 g de i.a./L a 20 °C)	
Extracto de cáscara de nuez.....	25.00
(Equivalente a 249.1 g de i.a./L a 20 °C)	
Extracto de lechuguilla.....	20.00
(Equivalente a 199.28 g de i.a./L a 20 °C)	
INGREDIENTES INERTES	
Diluyente.....	5.00
TOTAL.....	100.00



**Presentaciones:** 1 L y 20 L

**Número de registro:** RSCO-MEZC-FUNG-0920E-X0131-009-95.0

**Certificado OMRI:** bmn-20336

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:** 5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO**

**SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Arándano, Fresa, Frambuesa, Grosella, Zarzamora, Vid, Kiwi (0)	Moho gris <i>(Botrytis cinerea)</i>	1 – 3 L por ha	Realizar 3 aplicaciones al follaje en intervalos de 7 días, iniciando cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 500- 650 L de agua/ha.

( ) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede reentrarse al cultivo tratado una vez que la aplicación se ha secado.

**“MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”**

Agite perfectamente el producto. Para abrir el envase, gire la tapa hasta romper el arillo plástico, retire cuidadosamente el sello de seguridad colocado en la parte superior del envase para evitar salpicaduras, ya que los recipientes sellados pueden desarrollar presión. Agregue al tanque de aspersión la mitad de agua limpia requerida, mida con una probeta o con algún artículo graduado para este fin la cantidad de producto que se utilizará de acuerdo a la tabla de dosis y adiciónelo al tanque de mezcla, agite constantemente mientras agrega el resto del agua limpia. Es importante continuar la agitación de forma constante en el tanque de aspersión para mantener una solución uniforme y homogénea. Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar equipo de protección personal.

**“CONTRAINDICACIONES”** No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista una alta probabilidad de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta.

**“FITOTOXICIDAD”**

ACTIFUNG® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**“INCOMPATIBILIDAD”**

No se recomienda ACTIFUNG® en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”**

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”

